SELECT®

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE
HERBICIDE DE POST-LEVÉE

GROUPE	1	HERBICIDE

CONTIENT DU CLÉTHODIME

HERBICIDE DE POST-LEVÉE UTILISÉ POUR SUPPRIMER LES GRAMINÉES DANS LE CANOLA (incluant les variétés tolérantes à l'imazéthapyr), LE LIN (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique), LES POIS DE GRANDE CULTURE, LES LENTILLES, LES POIS CHICHES DESI ET KABULI, LES OIGNONS JAUNES, LES POMMES DE TERRE, LA MOUTARDE JAUNE, LA MOUTARDE JONCÉE (types condimentaire et à graine oléagineuse), LE SOYA, LES SEMIS DE LUZERNE, LES TOURNESOLS et LES HARICOTS SECS (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc).

AGRICOLE

GARANTIE: CLÉTHODIME . . . 240 g/L

N^{o} D'HOMOLOGATION 22625 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT: IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET : (250 mL - 9 LITRES)

Renseignements sur le produit : 1-866-761-9397

Arysta LifeScience Corporation
8-1, Akashicho
Chuo-ku, Tokyo, 104-6591
Japan

Zeamax Agriculture
P.O. Box 242
Osgoode, ON K0A 2W0
Canada

En cas de déversements, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler au numéro d'urgence suivant 1-800-424-9300 (24 heures par jour).

PRÉCAUTIONS:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Laver immédiatement la peau et les yeux éclaboussés par ce produit concentré. Ne pas inhaler les émanations. Éviter de respirer les bruines ou le brouillard de pulvérisation de ce produit.
Se laver les mains et la peau exposées après l'emploi de ce produit. Lors de l'utilisation, éviter de manger, boire ou fumer. Enlever et laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Éviter la dérive de pulvérisation. Éviter la contamination des étangs, des ruisseaux, des rivières et de toute végétation à conserver. Entreposer le contenant fermé hermétiquement loin des semences, aliments pour animaux, engrais, plantes et denrées alimentaires. Respecter les normes provinciales quant aux zones à protéger autour des étendues d'eau et les marécages.
Lors de la manipulation, de la préparation du mélange, du remplissage, du nettoyage et des réparations, porter des lunettes protectrices ou un écran facial, un tablier de caoutchouc, des gants résistant aux produits chimiques, des bottes de caoutchouc, une chemise à manches longues et un pantalon long.

Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, l'élimination des déchets ou le nettoyage de l'équipement.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à : **www.croplife.ca.**

PREMIERS SOINS:
Déplacer la victime hors de la zone contaminée. Enlever les vêtements contaminés. Garder la victime à la chaleur et au repos dans un endroit confortable.
En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau durant 15 minutes. Obtenir de l'aide médicale ou contacter un centre anti-poison IMMÉDIATEMENT.
En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau exposée avec de l'eau et du savon.
En cas d'inhalation: Déplacer la victime dans un endroit où elle peut respirer de l'air frais. Desserrer les vêtements. Obtenir de l'aide médicale immédiatement ou contacter un centre anti-poison. Si la respiration cesse, commencer la respiration artificielle.
En cas d'ingestion: Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré accidentellement, NE PAS provoquer le vomissement, mais donner de l'eau ou du lait à la victime et obtenir de l'aide médicale immédiatement ou contacter un centre anti-poison.
Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne qui a perdu connaissance.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter le patient selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le danger consécutif à l'aspiration de solvants à base de pétrole par les poumons doit être pesé en fonction de sa toxicité lorsqu'on envisage un lavage d'estomac.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE :
Produit entreposable à toute température. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Les insecticides et les fongicides doivent être entreposés à part des herbicides afin de prévenir une possibilité de contamination croisée.

ÉLIMINATION :
ÉLIMINATION DES CONTENANTS RECYCLABLES :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

SELECT® est une marque déposée d' Arysta LifeScience North America Corporation.

070118

09-MAY-2007

SELECT®

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE
HERBICIDE DE POST-LEVÉE

UTILISER AVEC
AMIGO®
ADJUVANT

GROUPE	1	HERBICIDE

CONTIENT DU CLÉTHODIME

HERBICIDE DE POST-LEVÉE UTILISÉ POUR SUPPRIMER LES GRAMINÉES DANS LE CANOLA (incluant les variétés tolérantes à l'imazéthapyr), LE LIN (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique), LES POIS DE GRANDE CULTURE, LES LENTILLES, LES POIS CHICHES DESI ET KABULI, LES OIGNONS JAUNES, LES POMMES DE TERRE, LA MOUTARDE JAUNE, LA MOUTARDE JONCÉE (types condimentaire et à graine oléagineuse), LE SOYA, LES SEMIS DE LUZERNE, LES TOURNESOLS et LES HARICOTS SECS (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc).

AGRICOLE

GARANTIE: CLÉTHODIME . . . 240 g/L

N^{o} D'HOMOLOGATION 22625 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT: IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET : (250 mL - 9 LITRES)

Renseignements sur le produit : 1-866-761-9397

Arysta LifeScience Corporation
8-1, Akashicho
Chuo-ku, Tokyo, 104-6591
Japan

Zeamax Agriculture
P.O. Box 242
Osgoode, ON K0A 2W0
Canada

En cas de déversements, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler au numéro d'urgence suivant 1-800-424-9300 (24 heures par jour).

SELECT® et Amigo® sont des marques déposées d'Arysta LifeScience North America Corporation.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
SELECT est un herbicide de post-levée sélectif utilisé pour la suppression d'une vaste gamme de graminées dans le canola (incluant les variétés tolérantes à l'imazéthapyr), le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique), les pois de grande culture, les lentilles, les pois chiches Desi et Kabuli, les oignons jaunes, les pommes de terre, la moutarde jaune, la moutarde joncée (types condimentaire et à graine oléagineuse), le soya, les semis de luzerne, les tournesols et les haricots secs (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc). **SELECT doit être utilisé seulement avec l'adjuvant AMIGO®.**

SELECT est un herbicide systémique qui est transloqué du feuillage traité vers les points de croissance des feuilles, des tiges et des racines. L'absorption par la plante s'effectue surtout au niveau des feuilles. Un bon recouvrement du feuillage est important afin d'assurer une suppression efficace des graminées. Les graminées susceptibles qui sont en pleine croissance présenteront des brûlures et un changement de couleur après le traitement. En premier lieu, le feuillage passera du vert au jaunâtre, puis au violacé et finalement au brun. Le temps requis pour une suppression complète est normalement de 7 à 21 jours après le traitement, le tout selon les conditions de croissance et de la compétition offerte par la culture.

PRÉCAUTIONS:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Laver immédiatement la peau et les yeux éclaboussés par ce produit concentré. Ne pas inhaler les émanations. Éviter de respirer les bruines ou le brouillard de pulvérisation de ce produit.
Se laver les mains et la peau exposées après l'emploi de ce produit. Lors de l'utilisation, éviter de manger, boire ou fumer. Enlever et laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Éviter la dérive de pulvérisation. Éviter la contamination des étangs, des ruisseaux, des rivières et de toute végétation à conserver. Entreposer le contenant fermé hermétiquement loin des semences, aliments pour animaux, engrais, plantes et denrées alimentaires. Respecter les normes provinciales quant aux zones à protéger autour des étendues d'eau et les marécages.
Lors de la manipulation, de la préparation du mélange, du remplissage, du nettoyage et des reparations, porter des lunettes protectrices ou un écran facial, un tablier de caoutchouc, des gants résistant aux produits chimiques, des bottes de caoutchouc, une chemise à manches longues et un pantalon long.

Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, l'élimination des déchets ou le nettoyage de l'équipement.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à : **www.croplife.ca.**

PREMIERS SOINS:
Déplacer la victime hors de la zone contaminée. Enlever les vêtements contaminés. Garder la victime à la chaleur et au repos dans un endroit confortable.
En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau durant 15 minutes. Obtenir de l'aide médicale ou contacter ou un centre anti-poison IMMÉDIATEMENT.
En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau exposée avec de l'eau et du savon.
En cas d'inhalation: Déplacer la victime dans un endroit où elle peut respirer de l'air frais. Desserrer les vêtements. Obtenir de l'aide médicale ou contacter un centre anti-poison. Si la respiration cesse, commencer la respiration artificielle.

En cas d'ingestion: Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré accidentellement, NE PAS provoquer le vomissement, mais donner de l'eau ou du lait à la victime et obtenir de l'aide médicale immédiatement ou contacter un centre anti-poison.
Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne qui a perdu connaissance.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter le patient selon les symptômes. Ce produit contient contient des distillats de pétrole. Le danger consécutif à l'aspiration de solvants à base de pétrole par les poumons doit être pesé en fonction de sa toxicité lorsqu'on envisage un lavage d'estomac.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE :
Produit entreposable à toute température. BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Les insecticides et les fongicides doivent être entreposés à part des herbicides afin de prévenir une possibilité de contamination croisée.

ÉLIMINATION :
ÉLIMINATION DES CONTENANTS RECYCLABLES :
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.
Avant d'aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

MODE D'EMPLOI
L'herbicide de post-levée SELECT concentré émulsifiable doit être utilisé seulement sur le canola (incluant les variétés tolérantes à l'imazéthapyr), le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique), les pois de grande culture, les lentilles, les pois chiches Desi et Kabuli, les oignons jaunes, les pommes de terre, la moutarde jaune, la moutarde joncée (types condimentaire et à graine oléagineuse), le soya, les semis de luzerne, les tournesols et les haricots secs (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc).

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

PÉRIODE D'APPLICATION:
Appliquer le SELECT lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2 à 6 feuilles comme spécifié dans Taux d'Application du SELECT. La suppression la plus efficace est obtenue lorsque le traitement est fait avant le tallage, lorsque les graminées annuelles sont petites et en pleine croissance.

Pour la répression ou la suppression du chiendent, appliquer le SELECT lorsque le chiendent est au stade 2 à 6 feuilles et lorsqu'il a de 6 à 15 cm de hauteur. Les résultats sont plus efficaces lorsque l'application est faite au stade 3 à 5 feuilles, lorsque le recouvrement du chiendent est uniforme et qu'il est en pleine croissance.

SELECT sera moins efficace lorsque les plantes sont stressées à cause d'un manque ou d'un excès d'humidité, de températures fraîches et/ou d'une humidité relative très faible. Une repousse par le tallage peut avoir lieu si l'application est effectuée sous une des conditions mentionnées précédemment. Dans des cultures sarclées où le recouvrement végétal peut prendre un certain temps avant d'être complet, un certain travail du sol peut être nécessaire afin de supprimer les graminées qui émergeront après le traitement.

Le canola (incluant les variétés tolérantes à l'imazéthapyr), le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique), les pois de grande culture, les lentilles, les pois chiches Desi et Kabuli, les oignons jaunes, les pommes de terre, la moutarde jaune, la moutarde joncée (types condimentaire et à graine oléagineuse), le soya, les semis de luzerne, les tournesols et les haricots secs (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc) sont tolérants au SELECT à tous les stades de croissance. Cependant, l'intervalle avant la récolte mentionné dans les recommandations doit être respecté pour éviter un excès dans les résidus de culture.

Pour les pois chiches Desi et Kabuli, appliquer SELECT au maximum une fois par saison avant que la culture ait atteint le stade de 9 noeuds (18 cm de hauteur maximum) et lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade 2 à 6 feuilles.

TAUX D'APPLICATION DU SELECT:
Les taux à utiliser afin de supprimer plusieurs espèces de graminées sont présentés ci-dessous. Se référer à la section sur les cultures pour connaître le taux maximal à utiliser pour chacune des cultures.

Graminées	**Stade du feuillage**	**Taux d'application du SELECT**	**Taux d'application d'adjuvant AMIGO**
*Sétaire (verte, glauque) Folle avoine Céréales spontanées (blé, orge, avoine)	2-4	0,125 L/ha	0,5% v/v
Pied-de-coq Panic capillaire Panic d'automne Panic millet Maïs spontané Alpiste des Canaries spontané	2-6	0,125 L/ha	0,5% v/v
Folle avoine Céréales spontanées (blé, orge, avoine) Sétaire (verte, glauque) Ivraie de perse Digitaire (astringente et sanguine) Panic millet Panic capillaire Panic d'automne Pied-de-coq	2-6	0,19 L/ha	0,5% v/v

Maïs spontané Alpiste des Canaries spontané Chiendent – répression			
Chiendent - suppression	2-6	0,38 L/ha	1,0 % v/v

*SELECT appliqué à la dose de 0,125 L/ha pour supprimer les mauvaises herbes énumérées dans cette partie du tableau, devrait être pulvérisé seulement dans les conditions suivantes:

- Bonne croissance de la culture
- Application hâtive (comme dans le tableau plus haut, avant le tallage)
- Ne pas mélanger en réservoir avec d'autres pesticides
- Ne pas pulvériser sur les céréales d'hiver spontanées
- Lorsqu'il y a une infestation légère à modérée des mauvaises herbes
- Fertilité et humidité adéquates
- Absence de stress et bonnes conditions de croissance

Si une des conditions mentionnées n'est pas présente au moment de la pulvérisation, utiliser une dose de 0,19 L/ha de SELECT.

RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES:

Cultures	**Taux d'application maximum du SELECT**	**Délai d'attente avant la récolte**
Canola	0,38 L/ha	60 jours
Lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique)	0,38 L/ha	60 jours
Pois de grande culture	0,38 L/ha	75 jours
Lentilles	0,38 L/ha	60 jours
Pois chiches Desi et Kabuli	0,19 L/ha	60 jours
Oignons jaunes	0,38 L/ha	60 jours
Pommes de terre	0,38 L/ha	45 jours
Moutarde jaune	0,38 L/ha	60 jours
Moutarde joncée (types condimentaire et à graine oléagineuse)	0,38 L/ha	60 jours
Soya	0,38 L/ha	75 jours
Semis de luzerne	0,38 L/ha	30 jours
Tournesols	0,38 L/ha	72 jours
Haricots Secs (Pinto, noir, Great Northern, zombi, rose et rond blanc)	0,19 L/ha	60 jours

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
SELECT ET BUCTRIL ® M:
Lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique): SELECT peut être mélangé en réservoir avec du Buctril M afin de supprimer en une seule pulvérisation certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées annuelles dans le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique). Appliquer dans 55 à 110 litres d'eau à l'hectare à une pression de 275 kPa. NE PAS pulvériser ce mélange en réservoir lorsque les plantes sont stressées. NE PAS pulvériser par temps chaud et humide. Respecter toutes les mises en garde, les restrictions et les recommandations quant à la période d'application qui figurent sur l'étiquette du Buctril M. Suivre les instructions les plus retrictives des étiquettes parmi tous les pesticides utilisés dans le mélange en réservoir.

Période d'application: Le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique) peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 cm jusqu'au début du stade bouton. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, appliquer lorsque le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique) a de 5 à 10 cm de hauteur et que les mauvaises herbes sont au stade plantule. Des traitements séparés doivent être effectués si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées annuelles ne sont pas au stade de traitement recommandé au même moment.

Taux d'application: Un mélange en réservoir de SELECT à raison de 0,19 L à 0,38 L/ha avec du Buctril M à 1,0 L/ha et avec l’adjuvant AMIGO à 0,5% à 1,0% v/v.

Mauvaises herbes supprimées: Telles qu'énumérées pour le SELECT lorsqu’ utilisé seul et également pour certaines plantules de mauvaises herbes à feuilles larges. Se référer à l'étiquette du Buctril M pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:
1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Faire fonctionner le système d'agitation.
3. S'il s'agit d'un mélange en réservoir de SELECT et de Buctril M pour supprimer à la fois les graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges dans le lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique) ajouter la quantité requise de Buctril M. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité requise de SELECT. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité requise d'adjuvant AMIGO avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou de faire fonctionner le système de dérivation.
7. S'il y a une période d'arrêt lors de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation fonctionne suffisamment pour bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer pendant la nuit.
8. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent immédiatement après avoir effectué une pulvérisation.

Voir la section portant sur l'ÉLIMINATION afin de connaître les directives à suivre pour éliminer les eaux de nettoyage.

SELECT ET CURTAIL ® M :
Lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique): SELECT peut être mélangé en réservoir avec CURTAIL M pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées dans la culture du lin. Pulvériser avec un volume minimum de 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa.

Respecter les limites et restrictions et suivre toutes les précautions et recommandations quant à la période d'application énoncées sur l'étiquette de CURTAIL M.

Période d'application : Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 à 15 cm. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le traitement contre le chardon des champs devrait être effectué lorsqu'il est entre 10 cm et le stade pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé pour le traitement, il faudrait alors faire deux pulvérisations séparées.

Taux d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec CURTAIL M à une dose de 1,5 à 2,0 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées : Mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette de l'herbicide SELECT et mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette de Curtail M. Se référer à l'étiquette du CURTAIL M pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées.

Délai d'attente avant le pâturage
Ne pas faucher les cultures traitées pour l'alimentation du bétail ou laisser le bétail paître dans les champs traités dans les 60 jours suivant l'application.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:
1. Nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir à demi d'eau propre le réservoir nettoyé. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Ajouter la quantité de CURTAIL M requise au réservoir. Continuer l'agitation.
4. Ajouter la quantité de SELECT requise au réservoir. Continuer l'agitation.
5. Ajouter la quantité d'adjuvant AMIGO nécessaire à ce qui reste d'eau pour remplir le réservoir.
6. Continuer l'agitation ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après une interruption lors de la pulvérisation, bien agiter avant de pulvériser à nouveau. Bien vérifier l'intérieur du réservoir afin de vous assurer que l'agitation du pulvérisateur est suffisante pour mélanger à nouveau la bouillie de pulvérisation. Ne pas laisser reposer le mélange durant toute une nuit. Dans le cas de mélanges en réservoir contenant des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, une clarification apparaîtra si l'agitation n'est pas continuelle.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution de détergent puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

SELECT ET MCPA ESTER:
Lin: SELECT peut être mélangé en réservoir avec MCPA Ester pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées dans la culture du lin. Pulvériser avec un volume de 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa.

NOTE: CE MÉLANGE EN RÉSERVOIR NE DOIT PAS ÊTRE PULVÉRISÉ SUR LES VARIÉTÉS DE LIN À BASSE TENEUR EN ACIDE LINOLÉNIQUE.

Période d'application: Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 cm jusqu'au début du stade bouton. Ne pas traiter après le stade bouton. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont au stade de plantule et en pleine croissance. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé pour le traitement, il faudrait alors faire deux pulvérisations séparées.

Taux d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha à 0,38 L/ha en mélange en réservoir avec MCPA ESTER et avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% à 1,0% v/v.

Mauvaises herbes supprimées: Telles qu'énumérées pour le SELECT lorsqu' utilisé seul et également pour certaines plantules de mauvaises herbes à feuilles larges. Se référer à l'étiquette du MCPA Ester pour le taux d'application, les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées et pour l'information spécifique au lin.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:
1. Nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir à demi d'eau propre le réservoir nettoyé. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Ajouter la quantité de MCPA ESTER requise au réservoir. Continuer l'agitation.
4. Ajouter la quantité de SELECT requise au réservoir. Continuer l'agitation.
5. Ajouter la quantité d'adjuvant AMIGO nécessaire à ce qui reste d'eau pour remplir le réservoir.
6. Continuer l'agitation ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après une interruption lors de la pulvérisation, bien agiter avant de pulvériser à nouveau. Bien vérifier l'intérieur du réservoir afin de vous assurer que l'agitation du pulvérisateur est suffisante pour mélanger à nouveau la bouillie de pulvérisation. Ne pas laisser reposer le mélange durant toute une nuit.
8. Immédiatement après l'utilisation, nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

SELECT ET LONTREL ® 360

Lin (incluant les variétés à basse teneur en acide linolénique): SELECT peut être mélangé en réservoir avec LONTREL 360 pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées dans la culture du lin. Pulvériser avec un volume minimum de 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa.

Respecter toutes les précautions, les restrictions et les recommandations quant à la période d'application qui figurent sur l'étiquette de LONTREL 360.

Période d'application : Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 à 10 cm. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le traitement contre le chardon des champs devrait être effectué lorsqu'il est entre les stades de rosette et pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé pour le traitement, il faudrait alors faire deux pulvérisations séparées.

Taux d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec LONTREL 360 à une dose de 0,56 à 0,83 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées: Folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané, avoine spontanée et renouée liseron.

Chardon des champs	0,56 L LONTREL 360/ha	Suppression durant toute la saison
	0,83 L LONTREL 360/ha	L'efficacité de la suppression peut s'étendre jusqu'à l'année suivante.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE: Pour les recommandations concernant le mélange, se rapporter au mélange en réservoir SELECT/LONTREL 360 dans le canola.

Canola: SELECT peut être mélangé en réservoir avec LONTREL 360 pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans la culture du canola. Pulvériser avec un volume minimum de 100 L/ha de solution à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, les restrictions et les recommandations quant à la période d'application qui figurent sur l'étiquette de LONTREL 360.

Période d'application : Le canola peut être traité entre le stade 2 et 6 feuilles. Appliquer lorsque les graminées sont entre le stade 2 et 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le traitement contre le chardon des champs devrait être effectué lorsqu'il est entre les stades de rosette et pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé pour le traitement, il faudrait alors faire deux pulvérisations séparées.

Taux d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec LONTREL 360 à une dose de 0,42 à 0,83 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées : Folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané et avoine spontanée.

Renouée liseron	0,56 L LONTREL 360/ha	Pour supprimer durant toute la saison
Chardon des champs	0,42 L LONTREL 360/ha	Supprime les parties aériennes pour 6 à 8 semaines
	0,56 L LONTREL 360/ha	Suppression durant toute la saison
	0,83 L LONTREL 360/ha	Suppression jusqu'à la saison suivante

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:

1. Nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir à demi d'eau propre le réservoir nettoyé. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Ajouter la quantité de LONTREL 360 requise au réservoir. Continuer l'agitation.
4. Ajouter la quantité de SELECT requise au réservoir. Continuer l'agitation.
5. Ajouter la quantité d'adjuvant AMIGO nécessaire à ce qui reste d'eau pour remplir le réservoir.
6. Continuer l'agitation ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après une interruption lors de la pulvérisation, bien agiter avant de pulvériser à nouveau. Bien vérifier l'intérieur du réservoir afin de vous assurer que l'agitation du pulvérisateur est suffisante pour mélanger à nouveau la bouillie de pulvérisation. Ne pas laisser reposer le mélange durant toute une nuit. Dans le cas de mélanges en réservoir contenant des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, une clarification apparaîtra si l'agitation n'est pas continuelle.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution de détergent puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

SELECT ET PURSUIT®:

Pois de grande culture: SELECT peut être mélangé en réservoir avec PURSUIT pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les pois de grande culture. Appliquer dans un minimum de 100 litres d'eau par hectare à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et les recommandations quant à la période d'application contenues sur l'étiquette de PURSUIT.

Période d'application: Les pois de grande culture peuvent être traités jusqu'au stade de 6 feuilles trifoliées. Traiter lorsque le blé spontané, l'orge spontanée, la folle avoine et la sétaire verte sont au stade 2 à 6 feuilles. Appliquer jusqu'au stade 4 feuilles pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé, il faudrait alors faire deux pulvérisations séparées.

Dose d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec PURSUIT à une dose de 210 mL/ha et avec l'adjuvant AMIGO à 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées : Folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané ainsi que les mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette de PURSUIT.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Débuter l'agitation.
3. S'il s'agit d'un mélange en réservoir de SELECT et de PURSUIT pour supprimer à la fois les graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges dans les pois de grande culture, ajouter la quantité requise de PURSUIT. Continuer l'agitation.
4. Ajouter la quantité requise de SELECT au réservoir. Continuer l'agitation.
5. Ajouter la quantité requise d'adjuvant AMIGO avec le restant de l'eau nécessaire au remplissage du réservoir.
6. Continuer l'agitation ou faire fonctionner le système de dérivation.
7. S'il y eu une période d'arrêt lors de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation est adéquat pour bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser reposer la bouillie pendant toute une nuit.
8. Immédiatement après l'application, nettoyer soigneusement le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

Canola tolérant à l'imazéthapyr (par exemple les variétés de canola possédant le gène SMART) : SELECT peut être mélangé en réservoir avec PURSUIT pour supprimer en une seule opération, certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées nuisibles dans les variétés de canola tolérantes à l'imazéthapyr. Appliquer dans un minimum de 100 litres d'eau par hectare et à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations quant à la période d'application contenues sur l'étiquette de PURSUIT.

Période d'application : Les variétés de canola tolérantes à l'imazéthapyr peuvent être traitées après que la culture a développé une (1) feuille complète. Traiter lorsque les graminées nuisibles sont au stade 2 à 6 feuilles. Appliquer jusqu'au stade 4 feuilles pour la suppression des mauvaises à feuilles larges.

Dose d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec PURSUIT à une dose de 0,105 ou 0,21 L/ha avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées : Telles qu'énumérées pour SELECT en plus des mauvaises herbes suivantes.

PURSUIT à une dose de 0,105 L/ha pour la suppression de la stellaire moyenne, l'ortie royale, l'amarante à racine rouge*, le tabouret des champs, le canola spontané (non tolérant à l'imazéthapyr), la moutarde des champs et la renouée liseron* au stade de 1 à 4 feuilles.

*Pour la suppression de faible infestation seulement. Pour de fortes infestations, utiliser la dose de 0,21 L/ha de PURSUIT.

PURSUIT à une dose de 0,21 L/ha pour la suppression des mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette de PURSUIT.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE: Pour les instructions, consulter la section de SELECT et PURSUIT sur les mélanges en réservoir pour les pois de grande culture.

SELECT ET MUSTER® :
Canola : SELECT peut être mélangé en réservoir avec MUSTER pour supprimer en une seule opération certaines mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées dans la culture du canola. Pulvériser avec un volume minimum de 100 L/ha de solution à une pression de 275 kPa. Bien suivre les précautions, les restrictions et recommandations quant à la période d'application que l'on retrouve sur l'étiquette de MUSTER.

Période d'application : Le canola peut être traité à partir du stade de 2 feuilles jusqu'à l'apparition des boutons floraux. Pulvériser lorsque les graminées sont aux stades de 2 à 6 feuilles et lorsque les mauvaises herbes à feuilles larges sont aux stades de cotylédon à 6 feuilles. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées ne sont pas en même temps au stade recommandé pour le traitement, il faudrait alors effectuer deux pulvérisations séparées.

Dose d'application : SELECT à une dose de 0,19 L/ha en mélange en réservoir avec MUSTER à une dose de 20 ou 30 g/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées : MUSTER à une dose de 20 ou 30 g/ha : folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, avoine spontanée, blé spontané, ortie royale, moutarde des champs, renouée scabre, sagesse-des-chirurgiens (au stade plantule), tabouret des champs* et l'amarante à racine rouge.

**Répression du tabouret des champs à la dose réduite. Appliquer au tabouret des champs au stade 1 à 4 feuilles.*

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:
1. Nettoyer à fond le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir à demi d'eau propre le réservoir nettoyé. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Ajouter la quantité de MUSTER requise au réservoir. Continuer l'agitation.
4. Aussitôt que le MUSTER est en suspension, ajouter la quantité de SELECT requise au réservoir. Continuer l'agitation.
5. Ajouter la quantité d'adjuvant AMIGO nécessaire à ce qui reste d'eau pour remplir le réservoir.
6. Continuer l'agitation ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Pour des remplissages répétés, préparer une bouillie de MUSTER et ajouter le volume d'eau nécessaire dans le réservoir du pulvérisateur avant l'ajout de SELECT et AMIGO.

8. Après une interruption lors de la pulvérisation, bien agiter avant de pulvériser à nouveau. Bien vérifier l'intérieur du réservoir afin de vous assurer que l'agitation dans le pulvérisateur est suffisante pour mélanger à nouveau la bouillie de pulvérisation. Ne pas laisser reposer le mélange durant toute une nuit.
9. Immédiatement après l'emploi, consulter l'étiquette de MUSTER pour les directives concernant un nettoyage approprié du réservoir.

SELECT ET LIBERTY® :
Canola : Pour utilisation seulement sur les variétés de canola tolérantes au glufosinate d'ammonium (par exemple sur les variétés ou les hybrides nommés LIBERTYLINK).

SELECT peut être mélangé avec LIBERTY pour la suppression de certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées nuisibles dans les variétés tolérantes au glufosinate d'ammonium lors d'un traitement en une seule étape. Appliquer dans un volume minimum de 110 L/ha et à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, limitations et recommandations quant à la période d'application retrouvées sur l'étiquette de LIBERTY.

Période d'application : Les variétés de canola tolérantes au glufosinate ammonium peuvent être traitées à partir du stade cotylédon jusqu'au début du stade de la montaison. Traiter lorsque la folle avoine, le blé spontané, l'avoine spontanée et la sétaire verte sont au stade 1 à 5 feuilles. Consulter l'étiquette de LIBERTY pour le temps d'application à une dose de 2,7 ou 3,3 L/ha sur toutes les autres graminées et mauvaises herbes à feuilles larges.

Taux d'application : SELECT à une dose de 0,06 L/ha mélangé en réservoir avec LIBERTY à une dose de 2,7 à 3,3 L/ha avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5% v/v.

Mauvaises herbes supprimées: Folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané et avoine spontanée en plus des autres graminées nuisibles et mauvaises herbes à feuilles larges énumérées sur l'étiquette de LIBERTY à une dose de 2,7 à 3,3 L/ha.

DIRECTIVES QUANT À LA PRÉPARATION DU MÉLANGE:
1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir le réservoir du pulvérisateur nettoyé à moitié d'eau propre. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Verser la quantité appropriée d'adjuvant **AMIGO** dans le réservoir. Continuer d'agiter jusqu'à bien mélangé.
4. ARRÊTER l'agitation. Verser la quantité requise de **LIBERTY** dans le réservoir. Mettre en marche le système d'agitation.
5. Verser la quantité appropriée de **SELECT** et le reste d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer d'agiter ou de mettre en marche le système de dérivation et pulvériser immédiatement.
7. Après toute interruption de l'épandage, bien agiter avant de reprendre la pulvérisation. Jeter un coup d'œil dans le réservoir pour s'assurer que l'agitation dans le pulvérisateur suffit à mélanger à nouveau les produits de la solution de pulvérisation. Ne pas laisser reposer la bouillie pendant la nuit. Dans le cas de mélanges de réservoir contenant des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, une clarification apparaîtra si l'agitation n'est pas continuelle.
8. Si une pellicule d'huile commence à se former dans le réservoir, vider et nettoyer le réservoir avec une solution de détergent puissante.
9. Immédiatement après l'emploi, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

UTILISATION SUR LES HARICOTS SECS (PINTO, NOIR, GREAT NORTHERN, ZOMBI, ROSE ET ROND BLANC) :
Pour supprimer les graminées nuisibles retrouvées sur l'étiquette de l'herbicide de post-levée SELECT concentré émulsifiable.

Période d'application : Faire une seule application par année, en postlevée et avec un pulvérisateur au sol. Appliquer SELECT à une dose de 0,125-0,19 L/ha avec l'adjuvant AMIGO à une dose de 0,5% v/v lorsque les graminées nuisibles sont au stade 2 à 6 feuilles.

AVIS À L'ACHETEUR ET À L'UTILISATEUR :
LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR USAGE SUR LES OIGNONS JAUNES : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour les oignons jaunes a été rédigé par des personnes autres que celles travaillant pour Arysta LifeScience Corporation et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Arysta LifeScience Corporation n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les oignons jaunes.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à latolérance des cultures, et ils accepetent de dégager Arysta LifeScience Corporation de toute responsabilité liée àdes réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit aux fins d'utilisation sur les oignons jaunes.

MODE D'EMPLOI
POUR UTILISATION SUR LES OIGNONS JAUNES
Pour la répression du pâturin annuel et la suppression d'autres graminées annuelles nuisibles retrouvées sur l'étiquette de l'herbicide de post-levée SELECT concentré émulsifiable.

PÉRIODE D'PPLICATION : Appliquer SELECT en post-levée lorsque la culture est au stade de 1 à 4 feuilles. Appliquer par voie terrestre. Une seule application par année. Respecter un DAAR de 45 jours.

Graminées	Stade du feuillage	Taux d'application du SELECT	Taux d'adjuvant AMIGO
Répression du pâturin annuel	2-6	0,38 L/ha	0,5% v/v

DIRECTIVES QUANT À LA PULVÉRISATION:

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE

Volume d'eau et pression de pulvérisation :

Pour une application terrestre, utiliser un pulvérisateur muni de buses à jet plat. Pour obtenir une couverture de pulvérisation optimale, utiliser des buses qui projettent à 45 degrés.

L'usage de buses de type jet miroir ou jet conique creux n'est pas recommandé à cause d'un recouvrement inégal et inadéquat. Une bonne pulvérisation uniforme sur toute la surface foliaire des mauvaises herbes visées est nécessaire afin d'obtenir une suppression optimale des mauvaises herbes.

Bien nettoyer tous les filtres afin de prévenir l'obstruction des buses, surtout lorsque les volumes d'eau sont de 55 à 110 L/ha.

En général, utiliser des volumes d'eau variant de 55 à 225 L/ha et une pression minimale de 275 kPa. Pour les pulvérisations effectuées lors d'infestations importantes de mauvaises herbes ou sur une culture dont le recouvrement est dense, utiliser un volume minimum de 110 litres d'eau à l'hectare et une pression de 275 à 425 kPa. En toute circonstance, vous assurer que la dose d'application d'AMIGO recommandée sur l'étiquette de SELECT est maintenue.

RESTRICTIONS ET LIMITATIONS:

1. Utiliser seulement sur les cultures énumérées sur l'étiquette.

2. Un bon travail du sol est requis avant le semis dans un champ où l'on a cultivé des plantes fourragères ou du gazon l'année précédente.

3. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que les bandes de pulvérisation ne se chevauchent.

4. L'efficacité du traitement est réduite si une pluie survient moins de 1 heure après l'application.

5. Ne pas mélanger ou appliquer l'herbicide de post-levée SELECT concentré émulsifiable avec tout autre additif, pesticide ou engrais sauf si on le recommande spécifiquement sur l'étiquette.

6. Attendre 4 jours entre le traitement avec le SELECT et l'application de tout autre produit agrochimique qui n'est pas recommandé sur l'étiquette pour des mélanges en réservoir.

7. Ne pas appliquer plus de 0,38 L/ha (90 grammes m.a./ha) par saison.

8. Après une application de SELECT, il ne faut pas faire paître les animaux ni les nourrir avec du fourrage vert avant que l'intervalle de temps approprié, comme spécifié dans le tableau des recommandations sur les cultures, ne soit respecté. Ne pas faucher comme fourrage les récoltes traitées avant que l'intervalle de temps approprié comme spécifié dans le tableau des recommandations sur les cultures ne soit respecté.

9. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE. **Appliquer à l'aide d'équipement terrestre seulement.**

10. Éviter de pulvériser et de créer une dérive sur les habitats fauniques tels que les brise-vent, les marécages, les marais humides ou secs, les boisés de même que sur la végétation des talus de fossés et sur le bord des champs. Laisser une zone tampon de 15 mètres entre la dernière bande de pulvérisation et tout habitat mentionné précédemment.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :

Gestion de la résistance à SELECT, herbicide du groupe 1. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à SELECT et à d'autres herbicides du groupe 1. Les biotypes résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, n spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux herbicides :

- Dans la mesure du possible, alterner SELECT ou les herbicides du même groupe 1 avec des herbicides appartenant à d'autres groupes et qui suppriment les mêmes mauvaises herbes au champ.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et de la rotation des cultures et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Empêcher la propagation à d'autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non contaminées.
- Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Arysta LifeScience North America Corporation au numéro 1-866-761-9397.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

070118

SELECT® et Amigo® sont des marques déposées d'Arysta LifeScience North America Corporation.
BUCTRIL® et LIBERTY® sont des marques déposées de Bayer.
LONTREL® 360 et CURTAIL sont des marques déposées de Dow AgroSciences LLC.
MUSTER® est une marque déposée de E.I. Dupont de Nemours et Company.
PURSUIT® est une marque déposée de BASF.

****

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))